

594.08

NH



FAUNA DE CATALUNYA

MONOGRAFIES PUBLICADES SOTA LA DIRECCIÓ
DE J. M. A. BOFILL I PICHOT
MEMBRE DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES

FAUNA MALACOLÒGICA

Fascicle IIP 54714 APR 22 1925

FAMILIA DE LES RETRÍCOLIDES

per

268270M. de Chia

Publicacions de l'Institut de Ciències

594.08

NH

SMITHSONIAN

SEP 09 1987

LIBRARIES

QL
455
S7I6
1913
fasc. III
MOLL

FAMILIA DE LES PETRICOLIDAE



FAMILIA PETRICOLIDAE

BIBLIOGRAFÍA

1870. HIDALGO (J. G.) — *Mol. mar.*, etc. — Madrid.

Petricola lithophaga Retzius.

1888. MARTORELL (J) — *Catal. col. conch.* — Barcelona.

Petricola lithophaga Retz.

1889-1890. CARUS (S. V.) — *Prodr. fam. Medit.* T.º II. — Stuttgart.

Petricola lithophaga Phil.

1908. TOMÁS (LL) — *Mol. mar. Catalunya.* — Barcelona.

Petricola lithophaga Retz.

Petricola ruperella Lam.

1911. CHÍA (M. DE) — *Apl. not. mol. Catalunya.* — Barcelona.

Petricola lithophaga Retz.

RECOPILACIÓ DE LES ESPECIES CITADES A CATALUNYA PELS AUTORS :

Petricola lithophaga Philippi.

— LITHOPHAGA Retzius.

— *ruperella* Lamarck.

P. LITHOPHAGA Retzius, VAR.

PETRICOLIDÆ

(Làm. II, figs. 21-22.)

Conquilla perforant, poc regular, equivalva, transversalment oval, més o menys oberta del costat posterior; charnera composta de tres dents, una d'elles obsoleta; sinuositat del manto fonda.

Aquesta família la forma el sol

GÈNERO PETRICOLA LAMARCK.

amb els mateixos caràcters d'ella i comprèn una sola espècie la

P. lithophaga Retzius.

C. prima, trencadissa, equivalva, molt inequilàtera, més o menys ovalada transversalment; costat davanter curt, rodonejat, una mica inflat; costat del darrera atenuat i lleument obert; superficie sens llustre, creuada per costelles radiants flexuoses i desiguals i per soles de creixement laminosos; color blanquinós o lleument groguenc.

Hab.: La Escala (Tomàs), Mataró (Hidalgo), Vilassar (Tomàs), Barcelona (Martorell) i Vilanova (Samà).

Obs.: Viu en la zona llitoral, dins les pedres calices i en les concrecions que's formen al peu de les colonies dels briozoaris.

El Sr. Samà ha trobat a Vilanova la varietat ex-forma

ruperella Lamarck, un poc rostrada posteriorment i amb l'esculturació radiant més forta.

Els majors exemplars d'aquesta espècie no soLEN passar de 16 mm. d'amplada per 12 d'altura.

A La Escala l'hem recullida dintre'l sòl de la calça urgàptica.

No és fàcil confondre aquesta espècie amb cap altra de les que habiten els nostres mars.

Fòssil se l'ha trobada en el plesancià i en el quaternari antic de la província de Barcelona (Almera i Bofill).



LÂMINA II

- | | |
|---|--|
| 1. — <i>Tapes aureus</i> Gm., tipu. | 12. — <i>Venus casina</i> L., var. |
| 2. — <i>Tapes aureus</i> Gm., var. | 13. — <i>Venus fasciata</i> Da Costa. |
| 3. — <i>Tapes aureus</i> Gm., var. | 14-15. — <i>Venus gallina</i> L., tipu. |
| 4. — <i>Tapes decussatus</i> L., var. | 16. — <i>Venus gallina</i> L., var. |
| 5-6. — <i>Tapes pullastra</i> Mtg., tipu. | 17. — <i>Venus nux</i> Gm. |
| 7. — <i>Tapes pullastra</i> Mtg., var. | 18-19. — <i>Venus ovata</i> Penn. |
| 8. — <i>Tapes rhomboides</i> Penn. | 20. — <i>Venus verrucosa</i> L. |
| 9-10. — <i>Venerupis irus</i> L. | 21-22. — <i>Petricola lithophaga</i> Retz. |
| 11. — <i>Venus casina</i> L. | |







MANUFACTURED IN HONG KONG

3 9088 00594 9763

